

# KANARIEKWEEK 2011

## Vorbereiding kweek

Preventieve kuur voor coccidiose (of lang schema met SULFA II voor atoxoplasmose)

- BAYCOX: 2 ml per liter gedurende 2 dagen gevolgd door
- ESB3 30%: 1 gram per liter 5 dagen, 2 dagen zuiver water, opnieuw 5 dagen 1 gram/ liter

Bij vaststelling aanwezige ziekte wordt deze behandeld

- Luchtwegeninfectie: SOLUDOX 3 gram per liter 10 dagen
- Trichomoniose met sinusitis: PARAPLUS ENERGIE 10 gram per liter 10 dagen
- Diarree: FLAGELLAMIX plus: 5 lepeltjes per liter water gedurende 7 dagen

Ondersteuning conditie, leverfunctie en stimulatie bevruchting

- Voldoende plat witzaad in de zaadmengeling in de rustperiode
- VIGO-CARNITINE 5ml/liter 1x per week (spierversterkend, tegen vervetting)
- HEPATO-CHOL 10ml/l 1x per week (helpt de leverfunctie, ontgiftiging van kleurstoffen)
- VITAMINE KADRIE: 5 ml per liter 1x per week (noodzakelijk voor goede bevruchting)

Eivoer 1 à 2x per week verstrekken: mogelijke extra's om aan het eivoer toe te voegen

- VIT-AZ-MIN (bron van mineralen, oligo-elementen, beschikbare calcium en zeewier)
- AMINO-FORT (bron van essentiële aminozuren, belangrijk voor zware postuurassen)
- GEZONDHEIDSOLIE (helpt de natuurlijke weerstand te verhogen)
- MULTIVITAMINE (bron van alle vitaminen, indien zelf gemaakt eivoer)

Licht geleidelijk opdrijven tot 14 à 15 uur per dag - starten met 12 uur

- best lampen met UV spectrum (Philips TLD 965 of Biolux® van Osram)
- levensduur lampen nagaan en eventueel overschakelen naar HF-ballast voor frequentie
- per week een half uur / mannen best eerst voorbereiden
- week van koppelen temperatuur ca 15°C

Eerst hokken en omgeving reinigen en ontsmetten: bv Virkon -S, Dettol, Javel, F10

Daarna nestkommen en omgeving behandelen voor uitwendige parasieten zoals rode bloedmijt :

- BYEMITE: 4 ml per liter voor de omgeving (zie flacon)
- CARBARYLPOEDER: rechtstreeks in de nesten of zelfs op vogel te gebruiken
- ARDAP spray, FRONTLINE: druppel in de hals (voor zwarte mijt)

Trimming van de lange bevedering (ogen, cloaca) met schaar

Insmeren van de pootjes met MASTIKEL voor schubben bij overjarige vogels

## Kweek

Behandeling voor colibacillose (= zweetziekte) gepaard met neststerfte

- FLAGELLAMIX PLUS: 5 lepeltjes per liter water in de eerste levensweek

Algemene gezondheidscontrole (zwarte stip/atoxoplasma/ornithosis/megabacteriën)

- GROG mengen onder eivoer tijdens kweek gedurende 1 à 2 maanden

## Gespeende jongen + kweekvogels na de laatste ronde

Behandeling voor coccidiose:

- BAYCOX: 2 ml per liter gedurende 2 dagen gevolgd door
- ESB3 30%: 1 gram per liter 5 dagen, 2 dagen zuiver water, opnieuw 5 dagen 1 gram/ liter

Indien nodig behandeling voor megabacteriën (= magerziekte, onverteerde zaden in de mest)

- MEGABAC PC: 10 lepeltjes per kg eivoer gedurende een aantal weken

HEPATO-CHOL en VIGO-CARNITINE elk 1x per week

(voor een goede conditie, bevedering & kleuropbouw, ondersteuning voor de leverfuncties)

Inenting tegen pokken met POULVAC -P canary® vanaf 4 weken in de vleugelplooi