

Megabacterie/ Coing Light Disease

Een probleempje kan er nog wel eens ontstaan als de mega bacterie de kop opsteekt. Deze bacterie begint in de kliermaag. De klierwand gaat ontsteken en zal minder verteringszuren produceren die nodig zijn voor het verteren van het zaad. In ernstige gevallen zitten er nog onverteerbare zaden in de ontlasting. Onder deskundige leiding zal de bacterie aangetoond kunnen worden onder een microscoop. De mega bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica. Hygiëne is hier erg belangrijk. Om de maag te ontzien het liefst wat zacht voer geven. b.v. gemengd met wat biogarde yoghurt om het zure klimaat in de maag weer wat op pijn te brengen. De sterfte onder de vogels is nooit massaal. Ze gaan meestal dood aan conditie verlies komt meestal voor bij kanaries en grasparkieten. In sommige gevallen heeft een behandeling met anti schimmel middelen succes. Belangrijk blijft gemakkelijk verteerbaar voer te geven om de kwetsbare periode te overbruggen.

- Sterk vermagerde vogels, erg lusteloos. De vogels worden letterlijk lichter en soms een gele kleur.

- Alle leeftijdscategorieën

- Chronisch verloop.

- Het voedsel wordt slecht verteerbaar. (Maagwand aangetast).

- Afweersysteem wordt zwakker.

Diagnose via bacteriologisch onderzoek.

Zwarte Stip.

Zwarte stip is een symptoom, geen ziekte.

- Oorzaak: verschillende ziekten, waaronder stress (90%).

Gaat mee in het ei, jong geboren met stip.

Therapie 1: 1 afgestreken theelepeltje "Tylosine" per liter water, 5 tot 10 dagen.

Nadeel: erg bitter van smaak, bij voorkeur wat zoetjes door het water mengen. Tijdens de kweek nogmaals herhalen.

Therapie 2: het geven van appelazijn door het drinkwater, 2cl per liter drinkwater. Frequentie: constant.